



Avertissements agricoles

BRETAGNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35700 RENNES ☎ 99 36 01 74

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Publication périodique

ÉDITION : GRANDES CULTURES

BULLETIN N°61

(Supplément au n°153)

11 décembre 1987

CEREALES

→ *pas de traitement contre les pucerons*

COLZA

→ *antigraminées spécifiques de post-levée*

CEREALES

L'infestation des cultures est nulle ou faible. Les pucerons sont peu virulifères.

Il est donc inutile de traiter.

COLZA

- Desherbage en post-levée (suite) : les antigraminées.

. **LEGURAME PM** et **KERB 50 W**, qui sont avant tout des antigraminées ont été décrits dans notre bulletin n° 57 du 23 septembre 1987. Nous rappelons également que **PRADONE TS** et **KERB ULTRA** sont efficaces contre ces adventices, en plus de leur effet contre les dicotylédones. **CLERDONE** est surtout un antidicotylédones, mais il possède une efficacité intéressante sur les pâturins.

P.2.7

. Antigaminées spécifiques de post-levée sur colza

Spécialité commerciale	Dose de spécialité par ha	OBSERVATIONS pour tous ces produits
FERVIN + huile (alloxydime-sodium)	0,75 à 1 kg + 3 l d'huile Schering 1 à 1,25 kg + 3 l d'huile Schering contre les graminées vivaces.	↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ --
FUSILADE X2 + AGRAL 90 (fluazifop-p-butyl)	1,25 l + 0,1 % du volume de bouillie soit 0,6l pour 100 l 1,5 l + 0,1 % contre les graminées vivaces.	Quel que soit le stade du colza. --
FERVINAL + huile (sethoxydime)	2 l + 3 l d'huile Schering 3 l + 3 l d'huile Schering contre les graminées vivaces.	De la levée jusqu'à début montaison des graminées. --
GALLANT (1) (haloxyfop-éthyl)	1 l 2 l contre les graminées vivaces et pâturins.	Application de préférence sur végétation ac- tive (en soi- rée si temps sec).
TARGA + Huile (quizalofop-éthyl)	1,25 l + 2 à 3 l d'huile Schering 3 l + 2 l d'huile Schering contre les graminées vivaces	

(1) Uniquement à l'automne

Remarques :

→ pour tous ces produits l'action contre les pâturins est en général insuffisante.

→ les mélanges avec CLERDONE sont déconseillés. Laissez 10 jours (avant ou après) entre l'application de Clerdone et de l'un de ces produits. Pour GALLANT, laissez 3 semaines si l'application de Gallant est réalisée avant Clerdone et 10 jours dans le cas contraire.

. RAPPELS : PRADONE TS ou CLERDONE doivent être utilisés sur des colzas sains et en bon état à partir du stade 4 feuilles vraies et lorsque le pivot racinaire atteint au moins 10 cm.

* * * * *

REABONNEMENT

Vous trouverez ci-joint un formulaire d'abonnement pour 1988.
Nous vous serions obligés de le retourner rapidement avec votre règlement.
Merci.